


# ACIL ÖNCEİ KULLANILAN İLAÇLAR



# KULLANILACAK İLAÇLAR

## ONAYSIZ KULLANILAN İLAÇLAR

✳️ Adrenalin

✳️ Dextroz % 5-10- 20

✳️ Atropin

✳️ Ringer Laktat

✳️ Parasetamol

✳️ %0.9 İzotonik  
Çözeltisi

✳️ İisordil 5 mg

✳️ Asitil Salisilik Asit

✳️ Etil Klorid Sprey

# ONAYLI KULLANILACAK İLAÇLAR

## ONAY ALINARAK KULLANILAN İLAÇLAR

*% 2'lik Lidokain*	*Antihistaminik	*Beta blokörler	*Diazepam	*Diltiazem
*Dopamin	*Midazolam	*Verapamil	*Amiadaron*	*Analjezik * (iv opiat)
*Naloksan	*Jetokain	*Aktif kömür	*Dobutamin*	*Kaptopril 25 mg
*Tüm sıvılar	*Magnezyum sülfat*	*Flumazenil	*Morfin	*Sodyum bicarbonat *(NaHCO3)*
*Pentothal 1gr amp.	*Kortikosteroid	*Antiemetik	*Salbutamol inhaler	*Furosemid
*Dimenhidrinad				

# KULLANILMAYACAK İLAÇLAR!!!

\*Aminokardol

\*Spazmolitik

\*Kalsiyum amp.

\*Prilocain (citanes)  
flk.

\*Nitroderm TTS

**ONAYSIZ  
KULLANILACAK  
İLAÇLAR**

# ONAYSIZ KULLANILAN İLAÇLAR



## ADRENALİN

- \* Periferde vasokonstriktör santralde vasodilatördür.
- \* Kardiyak arrestin her aşamasında endikedir
- \* İnce VF'yi kaba VF'ye çevirir.
- \* Yetişkin doz her 3-5 dkda 1 mg  
pediyatrik doz 0,01mg/kg 1/10.000 bolus uygulanır.
- \* Dezavantajı miyokardın o<sub>2</sub> gereksinimini artırır.

# ONAYSIZ KULLANILAN İLAÇLAR

## ATROPİN

- \* Vagal etkiyi deprese ederek SA düğümde hız artmasına ve AV düğümde iletinin hızlanmasını sağlar
- \* Yavaş kalbi hızlandırır.
- \* Morfin ve organafosfat intoksu sonucu oluşan bradikardileri düzeltmede kullanılır
- \* Yetişkin doz maks 3 mg pediyatrik doz 0,02mg/kg maks. 0,5 mg adolösansta 1 mg'dır



# ONAYSIZ KULLANILAN İLAÇLAR

## İSORDİL 5 MG DİLALTI

- ✦ Anjina pektoris ağrılarının tedavi ve önlenmesinde endikedir.
- ✦ MI tedavisinde MONA protokolünün N aşamasında yer alan nitrogliserin grubundadır.
- ✦ Ambulansta güvenli verilebilecek bir ilaçtır.
- ✦ Anjina pektoris esnasında 5 mg tb sublingual olarak kullanılır.





# ONAYSIZ KULLANILAN İLAÇLAR



## ASETİL SALİSİLİK ASİT

- \* Analjezik, Antipretik ve antienflamatuardır
- \* 75-325 mg dozlar arasında antiagregan özelliğe olup MI tedavi protokolleri arasında çok önemli yer tutar.
- \* 300 mg üzerindeki dozlarda analjezik özelliği başlar
- \* Ticari isimleri: Ecopirin 100-150-300 mg tb Coraspin tb...

# ONAYSIZ KULLANILAN İLAÇLAR



## PARASETAMOL

- ✳ Analjezik antipiretik özelliktedir
- ✳ Hafif ve orta şiddetli ağrılarda ve ağrıya eşlik eden ateşin düşürülmesinde kullanılır.
- ✳ Ticari şekilleri: Parol 500 mg tb, Minoset 150 mg şrp, Minoset 500 mg tablet

# ONAYSIZ KULLANILAN İLAÇLAR

## ETİL KLORİD SPREY

- ✱ Lokal soğutucu özelliği ile travmaya bağlı ağrıları dindirmede kullanılır.
- ✱ Spor yaralanmalarında endikedir.
- ✱ Haricen kullanılır.
- ✱ Açık yara ve mukozaya kullanılmamalıdır.
- ✱ Yüksek derecede alev alıcıdır sigara içerken kullanılmamalıdır.

# ONAYSIZ KULLANILAN İLAÇLAR

## RİNGER LAKTAT

- \* CPR Esnasında tercih sıvıdır.
- \* Metabolik asidozda. Diyabet ketozu. Çocuk diyareleri. Ağır enfeksiyon hastalıkları. Hafif böbrek yetmezliğinde
- \* Sıvı kayıpları ve hiponatremi durumlarında
  - \* İzotonik sodyum azalmasının karşılanmasında
  - \* Ekstraselüler sıvı hacminin düzeltilmesinde, organizmadaki sıvı ve elektrolit ihtiyaçlarının karşılanmasında endikedir.

# ONAYSIZ KULLANILAN İLAÇLAR

## %0.9 İZOTONİK SOLÜSYONU

- ✱ Extrasellüler sıvıyla aynı yoğunluğa sahiptir.
- ✱ Sıvı kayıplarında, asit-baz dengesizliğinde, diyabetik ketoasidozda, şok ve kanamalarda endikedir.
- ✱ KKKY, HT , ödemli hastalarda, su zehirlenmelerinde kontrendikedir.

# ONAYSIZ KULLANILAN İLAÇLAR

## DEXTROZ % 5-10-20

- \* Hipertoniktir. Genellikle %5'lik solüsyon kullanılır.
- \* Sıvı kayıplarında, asid-baz deng. hipoglisemide, alkolizmde, vücuttan sıvı atılmasını arttırmak için verilir.
- \* Beyin kanamalarında ve şüphelenildiği durumlarda kullanılmaz.

ONAY  
İSTENİLECEK  
İLAÇLAR

# ONAY İSTEYECEK İLAÇLAR

## LİDOKAİN



- \* Antiaritmal ve lokal anestezi etkisidir.
- \* Şoka dirençli VF/ nabızsız VT de, açık kalp ameliyatlarında, digital zeh. AMI'da kullanılır.
- \* İdame dozu: 1-1.5 mg/kg kullanılır. Maximum toplam doz 3mg/kg geçmemelidir.
- \* Karaciğerden geçişi esnasında önemli ölçüde metabolize edilir.



# ONAY İSTEYECEK İLAÇLAR

## ANTIİHİSTAMİNİKLER

- ✱ Histaminin etkisini önleyen antiallerjik etkili ilaçlardır.
- ✱ En sık kullanılanıldıkları hastalık rinittir.
- ✱ Ortaya çıkardığı en sıkıcı etki uyku hali vermeleridir.
- ✱ Ticari ismi: Avil tb. krem, amp. ve Cetryn tb. vb. vardır.

# ONAY İSTEYECEK İLAÇLAR

## BETA BLOKÖRLER

- ✱ Sempatik sinir sisteminin etkilerini bloke ederek kalbin iş yükünü azaltan ilaçlardır.
- ✱ Hipertansiyonda, angina, kalp krizi, KY, hipertroidizm, glokom, anksiyete ve panik atak tedavisinde kullanılır.
- ✱ Bradikardi, kalp bloğu, KOAH, böbrek, karaciğer ve periferik damar hastalıkları, diyabette dikkatli kullanılmalıdır.
- ✱ Propranolol(DİDERAL) en çok kullanılan beta blokördür.

# ONAY İSTEYECEK İLAÇLAR

## DİAZEPAM



- ✦ Sedatif etkilidir.
- ✦ Epileptik nöbetlerde, özel durumlarda anksiyete ve kardioversiyon öncesi sedasyon sağlamak için kullanılır.
- ✦ Hamilelikte, alkol ve sedatif ilaç almışlarda, solunum deprese olan hastalarda, hipotansiyonu olanlarda kullanılmaz.

# ONAY İSTEYECEK İLAÇLAR

## DİAZEPAM

- ✱ 5 mg/1 ml ve 10 mg/2 ml ampulleri vardır . Başka ilaçlarla karıştırılmadan verilmelidir.
- ✱ Çocuklarda rektal yoldan 0.5 mg/kg olacak şekilde verilmelidir.
- ✱ Alanda şiddetli anksiyetesi olan hastaya 2-5 mg IM yapılabilir.

# ONAY İSTEYECEK İLAÇLAR

## DİLTİZEM

- ✱ Kalsiyum kanal blokörüdür. Antiaritmik ve antiiskemik etkilidir.
- ✱ İletim hızını yavaşlattığı gibi koroner vazodilatasyon yapıcı etkileri vardır.
- ✱ Kalp bloğu ve kalp yetmezliğinde kullanılması kontrendikedir.
- ✱ HT, taşiaritmi ve angina pectoris tedavisinde kullanılır.
- ✱ SVT'de önerilen doz 0.25 mg/kg 'dır.

# ONAY İSTEYECEK İLAÇLAR

## DOPAMİN

- \* Kardiyotonik etkilidir.
- \* Akut KKY, şok olgularında, böbrek yetmezliğinde , akut zehirlenmelerde, diüretik tedavisinin etkisini artırmak ve desteklemekte endikedir.
- \* Bronşial astımda, taşiaritmilerde, böbrek üstü bezi tümörlerinde kontrendikedir.

# ONAY İSTEYECEK İLAÇLAR

## DOPAMİN

- \* Çocuklarda ve yaşlılarda kullanılmaz.
- \* Ağır hastalarda 5mcg/kg/dk hızla başlanır ve 5-10mcg/kg/dk artışlarla 20-50mcg/kg/dk'ya çıkarılmalıdır.
- \* Yan etki olarak sol ventrikül diastolünde istenmeyen bir yükselme olabilir.

# ONAY İSTEYECEK İLAÇLAR

## MIDAZOLAM (DORMİCUM)

- ✱ Anestezi öncesi premedikasyon olarak ve yoğun bakım ünitelerinden uzun süreli sedasyon sağlamak amacıyla kullanılır.
- ✱ Çocuklarda anestezi endüksiyonu için dormicum önerilmez.
- ✱ Erişkinlerde klasik doz 2-3 mg'dır.
- ✱ Dormicumdan sonra ajitasyon, istemsiz hareketler, öfke reaksiyonu saldırganlık gibi reaksiyonlar bildirilmiştir.





# ONAY İSTEYECEK İLAÇLAR

## VERAPAMİL

- ✳️ Kalsiyum kanal blokörüdür. AV iletimi deprese eder. SVT tedavisinde endikedir.
- ✳️ Beta blokörle tedavi edilmemiş hastalara verapamil verilmez hipotansiyon ve asistoli riski vardır.
- ✳️ Kc yet. Beta blokör kullananlarda, çocuklarda, 1.derece AV blokta dikkatli kullanılmalıdır.

# ONAY İSTEYECEK İLAÇLAR

## VERAPAMİL

- \* AV blokta, bradikardi de, kardiojenik şokta, HT, sinoatrial blokta kontrendikedir.
- \* SV Aritmi de 5-10mg, proksimal taşikardide gerekirse 5-10dk sonra 5mg kullanılır
- \* Ticari ismi: İsoptin, Tarka, Ormil, Fibrocard

# ONAY İSTEYECEK İLAÇLAR

## NALOKSAN

- \* Narkotiklerin aşırı doz alınımında kullanılan antidottur.
- \* İV yoldan 0,8mg naloksan % 5 dextrozla 10 ml tamamlanır. Toplam doz 2,4 mg'dır.
- \* Narkotik zehirlenmesi sonucu görülen stuporun , komanın, solunum baskılanmasının düzenlenmesini sağlar.
- \* Eroin, morfin, kodein, vb. ilaçların etkisini tersine çevirir.

# ONAY İSTEYECEK İLAÇLAR

## AMIADARON (CORDARONE)

- \* VF/ nabızsız VT, AF ve Atrial flutter, stabil dar kompleksli taşikardiler, stabil monomorfik VT'de endikedir.
- \* 2. ve 3. derece kalp bloğunda, dolaşım kollapsında, arteriyel hipotansiyonda, hipertroidizmde, bradikardi nedenli senkoplarda kontrendikedir.

# ONAY İSTEYECEK İLAÇLAR

## AMIADARON (CORDARONE)

### KARDİYAK ARREST DOZU

\*300 mg IV puşe  
(20-30 mL D5W'le dilüe )

\*Dirençliyse 150 mg IV tekrar

\*İnfüzyon 1 mg/dak ilk 6  
saatte

\*Ardından 0.5 mg/dk iv.

\*Ardından 0.5 mg/dk iv.

### ARİTMİ DOZU

\*150 mg iv 10 dk. içinde

\*1 mg/dk infüzyon ilk 6  
saatte

\*Gerekirse 150 mg IV  
puşe tekrarlanabilir

# ONAY İSTEYECEK İLAÇLAR

## ANALJEZİKLER

- \* Analjezik; ağrı kesmek için kullanılan her türlü ilaca denir.
- \* Analjezikler narkotikler ve narkotik olmayanlar olmak üzere 2'ye ayrılırlar.
- \* Narkotikler: morfin, dolantin, kodein, vb.
- \* Narkotik olmayanlar ise: salisilatlar, parasetamol, ibuprofen vb.

# ONAY İSTEYECEK İLAÇLAR

## JETOKAİN

- \* Lokal anestezi etkili bir ilaçtır.
- \* Diş hekimliğinde, sinir bloğu anesteziinde endikedir.
- \* Amid türü lokal anesteziiklere karşı aşırı duyarlı olduğu bilinen hastalarda, karaciğer rahatsızlığı olan kişilerde, diyabetlilerde, kardiyovasküler bozukluğu olanlarda kontrendikedir.

# ONAY İSTEYECEK İLAÇLAR

## AKTİF KÖMÜR

- ✱ İlaç ve kıymasallar ile olan zehirlenmelerin acil tedavisinde alınan maddenin gisten absorpsiyonunu azaltmak için kullanılır.
- ✱ **Yetişkin dozu:** 1gr/kg dozda ağızdan yada nazogastrik sonda ile verilir. İdame olarak 0.5mg/kg her 4 saatte tekrarlanabilir. max:100g aşılmamalıdır.
- ✱ **Çocuk dozu :** 1-2mg/kg 30 gr maximum doz dur. Daha sonra her 4 saatte 0.5mg/kg tekrarlanabilir.



# ONAY İSTEYECEK İLAÇLAR

## AKTİF KÖMÜR

- \* AK'ün adsorbe edebileceği madde alımı, solunum güvenliği olan hastada bilinmeyen madde alımında endikedir.
- \* Aktif karbon veya bilesimindeki maddelere karşı alerjisi olanlarda kullanılmamalıdır.
- \* Her toksik madde için aynı derecede etkili bir adsorban olmayabilir.
- \* Demir tuzları, siyanurler, lityum, borik asit, arsenik, etanol, metanol, etilen glikol, izopropanol gibi organik çözücüler üzerinde etkisi düşüktür.

# ONAY İSTEYECEK İLAÇLAR

## DOBUTAMİN

- \* Akut KKY, şok olgularında, A.pankreatitde, böbrek yetmz. kronik kalp ve böbrek hastalığında düretik etkisini artırmada, epidural anesteziye, antiaritmial ve barbiturat vb.gibi ilaçlarla olan akut zehirlenmede endikedir.
- \* Bronşiyal astımda, böbrek üstü bezi tümörlerinde (feokramasitoma), dar açılı glokomda, taşiaritmide ritim bozukluğunda kontrendikedir.
- \* Doz aralığı, dakikada 25-10 mcg/kg/ml olacak şekildedir.

# ONAY İSTEYECEK İLAÇLAR

## KAPTORİL 25 mg

- \* Güçlü bir ACE (Angiotensin-converting enzim) inhibitörüdür.
- \* Hipertansiyonda, kalp yetmezliğinde kullanılır.
- \* Tedaviye 2-3 defa 25 mg kaptorille başlanılır. 2 haftada cvp alınmazsa doz günde 3defa 50 mg çıkarılmalıdır.
- \* Max. Doz 450 mg aşmamalıdır.
- \* Böbrek yetmezliği olanlarda, etken maddeye aşırı duyarlı olanlarda, gebelik ve laktasyonda kontrendikedir.

A photograph of two newborn babies lying on their stomachs, wearing knitted hats. The baby on the left is wearing a dark blue hat with a teal band and two blue yarn buns on top. The baby on the right is wearing a dark purple hat with a purple band and two purple yarn buns on top. The babies are resting their heads on their arms. The background is a plain, light-colored wall.

Biliyorum uykunuz geldi ama  
az kaldı☺

# ONAY İSTEYECEK İLAÇLAR

## MAGNEZYUM SÜLFAT(MgSO)

- \* Magnezyum sülfat, çizgili kaslardaki kasılmayı azaltır ve asetilkolinin myoneural kavşaktan salınımını azaltarak periferik nöromuskular geçişi engeller.
- \* Kalp bloğu ve myocard hasarında kontrendikedir.
- \* Eklemsi nöbetlerinde,  
Torsades de pointes'i gibi polimomorfik VT  
Hipomagnezemi,  
Refractory ventriküler fibrilasyon da endikedir.

# ONAY İSTEYECEK İLAÇLAR

## MAGNEZYUM SÜLFAT

✱ Ciddi magnezyum eksikliği kardiyak aritmilere neden olur:

Dirençli VF, Ani kardiyak ölüm

✱ Bilinen hipomagnezemik durumun olduğu inatçı veya tekrarlayan VF / nabızsız VT

- 2 g, 10 mL dex.ile dilüe, 1-2 dakika puşe

✱ QT intervalinin uzadığı polimomorfik VT

- Yükleme dozu - 2 g, 50-100 mL dex.ile dilüe, 5-60 dakika infüzyon
- Takiben, 0.5-1 g/st İV (torsadı kontrol ederek doza devam et)

# ONAY İSTEYECEK İLAÇLAR

## FLUMAZENİL

- ✱ Benzodiazepinlerin merkezi sedatif etkilerinin tamamen veya kısmen tersine çevrilmesinde endikedir.
- ✱ KİBAS yada status epilepticus gibi hayatı tehdit edici durumların kontrolü için benzodiazepin verilmiş olan hastalarda kontrendikedir.
- ✱ Maksimum total doz 0.05 mg/kg veya 1 mg kadar 60 saniyelik aralarla(maksimum 4 kez) tekrarlanabilir.

# ONAY İSTEYECEK İLAÇLAR

## MORFİN

- \* Güçlü bir analjezik etkiye sahiptir.
- \* Vazodilatasyonla periferdeki kanlanmayı artırır kalbe geri dönüşü azaltır.
- \* Myocardın O<sub>2</sub> gereksinimini azaltır.
- \* Pulmoner ödemi periferde göllenmeyi sağlayarak azaltır.
- \* Morfin 10-20 mg / 1 ml, içeren enjeksiyonluk solüsyonlar halindedir. SC veya IM uygulanabilir.

**NOT:** Alanda 15 mg aşılmamalıdır.



# ONAY İSTEYECEK İLAÇLAR

## MORFİN

- ✳ Alanda verilmesi önerilen doz: sulandırılmış olan 10 ml'lik morfinden ilk önce 4 ml IV olarak çok yavaş verilir.
- ✳ Ağrı geçmediyse, durumuna göre 15 dakika ara ile 3 ml olacak şekilde tekrarlanabilir
- ✳ Hipotansiyon gelişirse hastayı düz yatırın ve ilacı kesin.
- ✳ Bradikardi veya solunum arrestine karşı elinizin altında atropin ve nalokson hazır bulundurun.

# ONAY İSTEYECEK İLAÇLAR

## MORFİN

- \* Kardiyojenik (konjestif kalp yetmezliğine eşlik eden) Pulmoner ödem, AMI, yanık ve diğer şiddetli ağrılar
- \* Astım, KOAH, hipotansiyon, solunum depresyonu, kafa travmaları, AMI, tanı konulmamış abdominal ağrılar, alkol ve barbiturat benzeri ilaç alınımında kontrendikedir.

# ONAY İSTEYECEK İLAÇLAR

## SODYUM BİCARBONAT( $\text{NaHCO}_3$ )

- ✳️ Asidozu gidermek için kullanılır.
- ✳️ Çok uzamış cpr'a cevap yoksa ve hiperpotasemide kullanılır.
- ✳️ Metabolik alkoloz ve respiratuar alkolozda kullanılır.
- ✳️ 1 mEq/kg IV olarak kullanılır.

# ONAY İSTEYECEK İLAÇLAR

## PENTOTHAL SODYUM 1gr

- ✱ Kısa süreli operasyonlarda, bölgesel anestezinin tamamlanmasında, analjezi ve kas gevşemesi için psikiatrik rahatsızlıklarda, konvülsif durumlarının kontrol altına alınmasında endikedir.
- ✱ Ciddi kardiovasküler rahatsızlık, hipotansiyon yada şok, addison hast. Şiddetli anemi vb. durumlarda kontrendikedir.

# ONAY İSTEYECEK İLAÇLAR

## KORTİKOSTEROİD

- \* Astımın en etkili ilacı steroidlerdir.
  - \* Mukus salgılanmasını azaltarak hava yollarında mukus birikimini önler.
  - \* Kronik astım tedavisinde endikedirler.
  - \* Kronik Astım Tedavisi
- Ağırlık derecesine göre günlük 7.5-60 mg prednizolon eşdeğeri dozlar tercih edilir.
- \* Ağırlık derecesine göre 0.25-2 mg/kg tek dozda verilir.(çocuklarda)

# ONAY İSTEYECEK İLAÇLAR

## SALBUTAMOL İNH.(VENTOLİN)

- \* Bronşları genişletir.
- \* Astım ve Kronik obstruktif akciğer hastalığına bağlı bronkospazmlarda endikedir.
- \* Semptomatik taşikardi ve ilaca karşı bilinen alerjik reaksiyonlarda kontrendikedir.
- \* **DİKKAT:** Kan basıncı, nabız, EKG düzenli izlenmelidir. Kalp hastalığı olan kişilerde daha dikkatli kullanılmalıdır.

# ONAY İSTEYECEK İLAÇLAR

## ANTIEMETİKLER

- \* Bulantı ve kusma semptomunun giderilmesinde kullanılan ilaçlara denir.
- \* Akut kusmalarda oral yol kullanılmaz.
- \* Antiemetik olarak kullanılan ilaçlar:
  - a) Skopolamin (Hiyosin)
  - b) Antihistaminikler (Dimenhidrinat)
  - c) Nöroleptikler (Klorpromazin)
  - d) Metoklopramid (Metpamid)
  - e) Trimetobenzamid (Emadur)

# ONAY İSTEYECEK İLAÇLAR

## FUROSEMİD

- \* Kıvrım diüretiği grubuna dahil bir idrar söktürücüdür. Etkisi henle kıvrımı üzerindedir.
- \* Furasemid, böbrek damarlarını genişletir, böbrek kan akımını artırır ve filtrasyon hızlandırır.



# ONAY İSTEYECEK İLAÇLAR

## FUROSEMİD

- ✱ Gut, diyabet, prostat hipertrofisinde kullanılması kontrendikedir.
- ✱ Sol kalp yetmezliği ve akciğer ödemi tedavisinde kullanılmaktadır.
- ✱ Günde 20-250mg, zorlu diürez amacıyla 0.5-2g dozunda kullanılır.

# ONAY İSTEYECEK İLAÇLAR

## DİMENHİDRİNAT

- ✱ Taşıt tutmasına karşı en etkili antihistaminik ilaçtır. Antiemetik ilaçlardan antihistaminikler gurubuna girer.
- ✱ Deniz tutması, uçak tutması, tren, otomobil ve otobüs tutması, Meniere sendromunda endikedir.

# ONAY İSTEYECEK İLAÇLAR

## DİMENHİDRİNAT

- ✱ Refleks azalması ve uyuşukluk nedeniyle motorlu taşıt kullanma esnasında, epilepside ve yenidoğanda kontrendikedir.
- ✱ Başlangıçta 50-100mg dozunda kullanılır. (oral yada parenteral)
- ✱ Günlük yetişkin toplam dozu 400mg'dır

ONAY  
İSTENİLECEK  
SIVILAR

# ONAY İSTEYECEK SIVILAR

## ISOLYTE (%5 DEXTROZLU)

- \* Bebek ve küçük çocuklarda su ve elektrolit dengesinin boz. , böbreklerin idrarı idrarı konsantre edebilme yeteneğinin zayıfladığı durumlar, aşırı su kaybı, hafif metabolik asidozda endikedir.
- \* Ağır böbrek hastalığı, sürrenal yetmezliği ve hipoparaitiroidizm, diyabetes insipitus, hipopotasemi, sulfitlere duyarlı olduğu bilinen hastalarda kontrendikedir.

# ONAY İSTEYECEK SIVILAR

## TEOBAG 200

(200mg Teofilin +%5 Dextroz Çözeltisi)

- \* Astım belirtilerinin tedavisi ve önlenmesinde, kronik bronşit ve anfizemde görülen reverzibi bronkospazm belirtilerinin tedavi ve önlenmesinde endikedir.
- \* Teobag 200 bileşiminde bulunan maddelere karşı aşırı duyarlı olanlara karşı kontrendikedir.

# ONAY İSTEYECEK SIVILAR

## PROCALAMİNE

### (%3 Amino Asit ve %3 Gliserin Sodyumu)

- \* Kısa bir süre için paranteral beslenmeye ihtiyacı olan erişkin hastalarda vücuda proteinlerin karışması ve azot dengesinin düzeltilmesi amacıyla periferik yoldan uygulanır.
- \* Böbrek yetmezliği, ileri derece de karaciğer hastalığı ve karaciğer koması, azalmış azot ütilizasyonu ile birlikte seyreden hastalıklar, bir veya daha fazla amino aside karşı aşırı duyarlılık durumunda kontrendikedir.

# ONAY İSTEYECEK SIVILAR

## RHEOMACRODEX

- \* Kapiller dolaşımın yavaşladığı durumlar (şok, yanık)
- \* Arter ve ven dolaşım bozuklukları (gangren tehdidi)
- \* Ameliyat ve travma sonrası damar ve plastik cerrahi sırasında görülebilecek tromboembolik olayın profilaksisinde endikedir.



# ONAY İSTEYECEK SIVILAR

## MACRODEX SOLÜSYONU

- ✱ Dolaşan kan hacminin azalmış bulunduğu kanama, travma, yanık, ameliyata bağlı şokların tedavisinde endikedir.
- ✱ Dextrana aşırı duyarlılığı olduğu bilinen hastalarda kontrendikedir

# ONAY İSTEYECEK SIVILAR

## İZOLEX SOLÜSYONU

- ✱ Ağızdan besin alamayan ameliyatlı hastalarda
  - a) Dehidratasyonun önlenmesi ve tedavisi ile elektrolit dengesizliğinin düzeltilmesi için
  - b) Hipopotaseminin düzeltilmesi için
  - c) Asidoz tedavisi için kullanılır.
- ✱ Anüri, böbrek yet. Crush send. hemodiyaliz, kalp bloğu plazmadaki potasyum yüksek olduğunda ve alkolozda kontrendikedir.

# ONAY İSTEYECEK SIVILAR

## İZOLEN SOLÜSYONU

- \* Ağız yoluyla su alamayanlarda, hafif metabolik asidozda, muhtelif dehidratasyonda, su ve elektrolit alamayan ve kaybeden kişilerde endikedir.
- \* Sürrenal korteks yet. Kalp bloğunda, böbrek yet. Crush send. Ağır hemolizde ve anüride kontrendikedir.

# ONAY İSTEYECEK SIVILAR

## MANNİTOL SOLÜSYONU

- \* Kafa içi basıncını ve kitlesinin azaltılması, artmış göz içi basıncının azaltılması, idrar çıkışının artırılması, iskemi sonucu oluşan oligürinin önlenmesinde endikedir.
- \* Anüri, aktif kafa içi kanaması, sıvı elektrolit azlığı, kalp yet. durumlarında kontrendikedir.

**KULLANILMAYACAK  
İLAÇLAR**

# KULLANILMYACAK İLAÇLAR

## AMİNACADOL amp.

- \* Bronşiyal astım, kronik bronşit ve amfizeme bağlı bronkospazm, sol ventrikül yetmezliğine bağlı akut pulmoner ödem ve paroksizmal noktürnal dispnenin tedavisinde endikedir.
- \* Aktif peptik ülser ve aktif gastritli hastalarda kullanılmamalıdır

# KULLANILMYACAK İLAÇLAR

## AMİNACADOL amp.

- \* Akut olgularda 1 ampul i.v. olarak yavaş şekilde (5 dakika) zerkedilir. Tercihen ilaç %5'lik 10-20 ml dekstroz veya %5'lik 100-200 ml glikoz veya serum fizyolojik ile sulandırılıp uygulanır.
- \* yükleme dozu yetişkinler ve çocuklar için 6 mg/kg'dır. İdame tedavisi olarak enfüzyonlar tekrar edilir, 8-12 saatte bir, 4 mg/kg veya 8 mg/kg ampul uygulanır.

# KULLANILMYACAK İLAÇLAR

## CALCIUM Ampul

\* Değişik kaynaklı osteoporozlarda, raşitizm ve osteomalazi tedavisine ek olarak, gizli tetani , alerjik durumlarda, kadınların gebelik ve emzirme dönemleriyle çocukların büyüme ve gelişme devrelerinde artan kalsiyum gereksiniminin karşılanmasında endikedir.



# KULLANILMAYACAK İLAÇLAR

## CALCIUM Ampul

- \* İlacı aşırı duyarlılık, hiperkalsemi , şiddetli hiperkalsiüri, ağır renal yetmezlik durumlarında kontrendikedir
- \* Günlük doz erişkinlerde 1 ampul ve çocuklarda 1/4-1/2 ampuldür. I.M. ya I.V. uygulanır.

# KULLANILMYACAK İLAÇLAR

## CITANEST

- \* Lokal infiltrasyon, küçük ve büyük sinir blokları, epidural blok ve artroskopi dahil çeşitli anestezi yöntemlerinde kullanılabilir.
- \* Intravenöz bölgesel anestezide ilk ilaç olarak prilokainin tercih edilmesi önerilmektedir.

# KULLANILMYACAK İLAÇLAR

## CITANEST (PRILOCAİN)

- \* Amid grubu lokal anesteziyelere ya da bileşiminde bulunan diğer maddelere aşırıduyarlı olan hastalarda,
- \* Konjenital ya da idiyopatik methemoglobinemili hastalarda kullanılmamalıdır.

# KULLANILMYACAK İLAÇLAR

## NİTRODERM

- ✱ Anjina pektorisin uzun süreli tedavisi ve önlenmesi, kardiyak glikozidler, diüretikler, ADE inhibitörleri ya da arteryel vazodilatörlerle bir arada ağır kronik Miyokart yetersizliğin uzun süreli tedavisi, pulmoner hipertansiyonda endikedir.
- ✱ Akut dolaşım yet. Kalp şoku, şiddetli hipotansiyonda kontrendikedir.

# KULLANILMYACAK İLAÇLAR

## SPAZMOLİTİKLER

- \* Spazmolitik ilaçlar spazm çözücü özelliğe sahiptir.
- \* Gastrointestinal spazmlar, mide veya duodenum ülserleri, kolon spazmları, spastik kabızlık ve kolitler, safra kesesi spazmları ve safra taşlarından kaynaklanan ağrılar, dismenore, uterus spazmları ve doğum esnasındaki yumuşak doku spazmlarında endikedir.

# KULLANILMYACAK İLAÇLAR

## SPAZMOLİTİKLER

- \*Glokom, prostat hipertrofisine bağlı idrar retansiyonu, gastrointestinal sistemin mekanik stenozları, megakolon, myasthenia gravis ve taşikardi varlığında kullanılmamalıdır.
- \*Ticari ismi: Buscopan

HADI BAKALIM  
BIRAZ DA SORU  
ÇÖZELİMMM



AŐAĖIDAKİ İLAÇLARDAN  
HANGİSİ CPR'DA  
KULLANILMAZ?

- A. ADRENALİN
- B. ATROPİN
- C. NALOKSAN
- D. LİDOKAİN



C.

NALOKSAN

AŐAĐIDAKİ İLAĐLARDAN  
HANGİSİ ONAYSIZ  
KULLANILACAK İLAĐLAR  
ARASINDA YER ALIR?

A. KAPTORİL 25 mg

B. İSORDİL 5 mg

C. VERAPAMİL

D. DİLTİAZEM

**B.** ISORDIL 5 mg

Aşağıdaki ilaçlardan  
hangisinin kullanımı  
yasaktır?

- A.** Dimenhidrinad
- B.** Spazmolitik
- C.** Antiemetik
- D.** Flumazenil

B.

SPAZMOLİTİKLER



Baby's first Christmas

TEŞEKKÜRLER...

