

ERİŞKİN GKS		PEDIATRİK GKS	
GÖZ AÇMA	PUAN	GÖZ AÇMA	PUAN
Spontan	4	Spontan	4
Sözlü uyararla	3	Sözlü uyararla	3
Ağrılı uyararla	2	Ağrılı uyararla	2
Yanıt yok	1	Ağrılı uyararla	1
VERBAL YANIT		VERBAL YANIT	
Oryante	5	Manasız sözler	5
Konfüze	4	Huzursuz ağlama	4
Uygunsuz yanıt	3	Ağrıyla ağlama	3
Anlaşılmaz sesler	2	Ağrıyla inleme	2
Yanıt yok	1	Yanıt yok	1
MOTOR YANIT		MOTOR YANIT	
Emirlere uyar	6	Normal spontan yanıt	6
Ağrıyı lokalize eder	5	Dokunma ile çeker	5
Ağrıyla çeker	4	Ağrıyla çeker	4
Ağrıya fleksör yanıt	3	Ağrıya fleksör yanıt	3
Ağrıya ekstansör yanıt	2	Ağrıya ekstansör yanıt	2
Yanıt yok	1	Yanıt yok	1

Kaynak:European Journal of Neurology 2002,9:207-219

RİSK FAKTÖRLERİ VE KAFA İÇİ BASINÇ ARTIŞI İKAZ BULGULARI
Belirsiz-şüpheli kaza öyküsü
Devam eden posttravmatik amnezi
30 dakikadan uzun süren retrograd amnezi
Kafa tabanı fraktür bulguları veya çökme kırığı
Şiddetli baş ağrısı
Kusma
Pupil asimetrisi(1mm'den fazla çap farkı)
Fiks pupil(1 mm'den az aşığa yanıt)
Fokal nörolojik defisit
Nöbet
<2 yaş
>60 yaş
Koagülasyon bozuklukları
Yüksek enerjili kazalar
Alkol-ilaç intoksikasyonları

BBT ANORMAL BULGULAR

Kranial fraktür(lineer,çökme,kafa tabanı)

Epidural-Subdural hematom

Kontüzyon

İntrakranial hemoraji

Beyin ödemi(lokal-diffüz)

Subaraknoid kanama

Pnömoşefali

Kafa travmalı hastaya yada yakınına gözlem sonrası verilmesi gereken yazılı ikaz bulguları

Şiddetli baş ağrısı

Fışkırır tarzda kusma

Anlaşılmayan mantıksız konuşmalar

Kol veya bacaklarda ani gelişen kuvvetsizlik

Çevresindeki insanları tanımama

30 dakikadan uzun süren hafıza kaybı

Bu bulgular görüldüğünde en yakın merkeze başvurulmalıdır.